

L'humidité est correcte quand le toucher du compost est comparable à celui d'une éponge essorée.

Dans le même ordre d'idée, si vous ne recyclez que des déchets de cuisine, le compost va manquer d'éléments structurants. Lors du retournement, apportez des branchages coupés en pièces ou deux caquettes coupées en morceaux.

Le retournement est l'occasion de vérifier si les vers de compost (*Eisenia foetida*) sont bien là. Normalement, ils apparaissent spontanément, même si le Recyplant se trouve sur un support inerte. S'il n'y en a pas, il faut en apporter. On peut les acheter sur Internet (voir les coordonnées d'un fournisseur à la fin du livre), ou les prendre dans le compost mûr d'un ami jardinier. 250 g suffisent pour ensemer un bac.

Par contre, il est possible de rencontrer dans le compost quelques gros vers blancs. Ce sont des larves de hannetons qui vont dévorer les racines des futures plantations. Dans d'autres cultures alimentaires, ces vers consommés vivants constituent un mets de choix. Ce n'est pas le cas en Occident, il faut donc malheureusement les détruire.

On laissera 1 mois de repos entre le retournement et la plantation sur les côtés afin que l'ensemble se stabilise.

Après plusieurs années de recyclage, on obtient un substrat de couleur sombre qui ressemble à de l'humus, avec une bonne odeur de sous-bois... comme si on avait façonné son propre sol.

ERRATUM

Ce vers blanc n'est pas une larve de hanneton, mais une larve de cétoine dorée. Contrairement à celles de hanneton, ces larves spécifiques du compost ne sont pas nuisibles. Elles n'attaquent pas les racines des plantes et participent au processus de dégradation des déchets.

Il ne faut donc pas les détruire.



Larve de hanneton